

Was sollte ich über Xarelto wissen?

- ◆ Xarelto verdünnt das Blut und schützt Sie so vor der Bildung gefährlicher Blutgerinnsel.
- ◆ Xarelto muss genau nach Anleitung Ihres Arztes eingenommen werden. Um einen optimalen Schutz vor Blutgerinnseln zu gewährleisten, **lassen Sie niemals eine Dosis aus.**
- ◆ Sie dürfen Xarelto nicht absetzen, ohne vorher mit Ihrem Arzt gesprochen zu haben, da sich das Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln bei Ihnen erhöhen könnte.

- ◆ Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker über jedes andere Arzneimittel, welches Sie zurzeit einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen einzunehmen, bevor Sie mit der Einnahme von Xarelto beginnen.
- ◆ Informieren Sie Ihren Arzt vor jeglicher Operation oder invasivem Verfahren darüber, dass Sie Xarelto einnehmen.

Wann sollte ich meinen Arzt oder Apotheker um Rat fragen?

Bei der Einnahme eines Blutgerinnungshemmers wie Xarelto ist es wichtig, mit den möglichen Nebenwirkungen

vertraut zu sein. Eine Blutung ist die am häufigsten auftretende Nebenwirkung. Beginnen Sie nicht mit der Einnahme von Xarelto, wenn Sie wissen, dass bei Ihnen ein Blutungsrisiko besteht. Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt darüber. Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen folgende Anzeichen oder Symptome für eine Blutung bestehen:

- ◆ Schmerzen
- ◆ Schwellung oder Unwohlsein
- ◆ Kopfschmerzen, Schwindel oder Schwäche
- ◆ Ungewöhnliche blaue Flecken, Nasenbluten, Zahnfleischbluten, lang anhaltende oder sehr starke Blutungen aus Schnittwunden
- ◆ Eine Monatsblutung oder vaginale Blutung, die stärker ist als üblich

- ◆ Blut in Ihrem Urin, der dadurch rötlich oder braun aussehen kann, rot oder schwarz gefärbter Stuhl
- ◆ Abhusten von Blut oder blutiges bzw. kaffeesatzartiges Erbrechen

Wie nehme ich Xarelto ein?

- ◆ Für einen optimalen Schutz
 - kann Xarelto 2,5 mg unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden
 - kann Xarelto 10 mg unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden
 - muss Xarelto 15 mg zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden
 - muss Xarelto 20 mg zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden

86616262 DE

Patientenausweis



Xarelto® 2,5 mg ☐
Xarelto® 10 mg ☐
Xarelto® 15 mg ☐
Xarelto® 20 mg ☐

- ◆ Tragen Sie diesen Ausweis ständig bei sich
- ◆ Zeigen Sie diesen Ausweis jedem Arzt oder Zahnarzt vor der Behandlung

**Ich stehe unter einer blutgerinnungshemmenden
Behandlung mit Xarelto (Rivaroxaban).**

Name: _____

Andere Medikamente / Erkrankungen: _____

Anschrift: _____

Geburtsdatum: _____

Gewicht: _____

**Bitte verständigen Sie
im Notfall:**

Name des Arztes: _____

Telefonnummer des Arztes: _____

Arztstempel: _____

**Bitte verständigen Sie
auch:**

Name: _____

Telefonnummer: _____

Beziehung: _____

**Information für den Arzt
oder Apotheker:**

- ♦ Die INR ist zur Bestimmung der antikoagulatorischen Wirkung von Xarelto nicht aussagekräftig und sollte deshalb nicht angewendet werden.



Bayer

DE 5